



UTÁNKÖVETÉS/TUMORMENTESSÉG

Az idejében felismert betegség és a megfelelő időben elkezdett terápia hatására a betegség jó eséllyel gyógyítható. Amennyiben a kezelések eredményesek voltak, és daganatos betegség nem maradt vissza, rendkívül fontos a kontroll vizsgálatokra való jelentkezés.

A differenciált pajzsmirigyrákok sikeres terápiáját követően fontos, hogy a beteget követni kell, az esetleges kiújulást időben fel kell ismerni. Az időszakos képalkotó (jelen esetben ultrahang) vizsgálatok során a radiológusok átnézik a nyakat, a pajzsmirigyágyat, és a korábbi vizsgálatokon nem látott, kóros szövetburjánzást keresik, mint a kiújulás morfológiai jelét.

Mivel azonban egy hormontermelő szervről van szó, és a daganat általában hasonlít funkciójában a kiindulási szervhez, a pajzsmirigy által termelt fehérje, az ún. thyreoglobulin nagyon jól használható tumormarkerként, és a szintje jól korrelál a szervezetben lévő pajzsmirigy(daganat) szövet mennyiségével. Így az ultrahangvizsgálatok mellett fontos a thyreoglobulin monitorozása vérvétellel, annak emelkedése esetén az esetleges kiújulást ki kell zárni képalkotó vizsgálatokkal (ultrahang, CT/MR, szcintigráfia). Azt, hogy a kontrollvizsgálatokra milyen gyakran fog sor kerülni, az orvosod egyénileg, az állapotod, eredményeid alapján határozza meg.

Ne feledkezz meg a rendszeres kontrollvizsgálatokról! Minden jót kívánunk neked!